

【非小細胞肺癌】

レジメン名称:ライブリバント+ラズクルーズ(80kg未満)【1コース目】

催吐性リスク:軽度

インターバル日数:28 日

基準日:day 1

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
7	点滴静注	ライブリバント点滴静注	350mg/body		day1	フィルター付き	非炎症性
8	点滴静注	ライブリバント点滴静注	700mg/body		day2	フィルター付き	非炎症性
9	点滴静注	ライブリバント点滴静注	1050mg/body		day8,15,22	フィルター付き	非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day8	day15	day22
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ボラミン注5mg/1ml ファモチジン静注20mg/20ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	12A 1A 1A 100ml	投与順2				
3	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ボラミン注5mg/1ml ファモチジン静注20mg/20ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	6A 1A 1A 100ml		投与順2			
4	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ボラミン注5mg/1ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 1A 100ml			投与順2	投与順2	投与順2
5	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間45分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml	投与順3				
6	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml		投与順3	投与順3	投与順3	投与順3
7	点滴静注	ライブリバント点滴静注 生理食塩液 250ml 点滴静注: * 50ml/hrで開始、2時間後75ml/hrに増量可 投与経路:末梢ルートメイン側管	350mg/body 計250ml	投与順4				
8	点滴静注	ライブリバント点滴静注 生理食塩液 250ml 点滴静注: * 50ml/hrで開始、2時間後75ml/hrに増量可 投与経路:末梢ルートメイン側管	700mg/body 計250ml		投与順4			
9	点滴静注	ライブリバント点滴静注 生理食塩液 250ml 点滴静注: * day8は85ml/hr、day15,22は125ml/hrで投与 投与経路:末梢ルートメイン側管	1050mg/body 計250ml			投与順4	投与順4	投与順4
10	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順5	投与順5	投与順5	投与順5	投与順5

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day8	day15	day22
1	内服	アセトアミノフェン錠500mg	1000mg	1000mg	1000mg	1000mg	1000mg	1000mg
2	内服	ラズクルーズ錠	240mg	1日1回 連日投与				

★治療開始後4か月間、アピキサバン1回2.5mg1日2回経口投与

★アセトアミノフェンはライブリバントの投与30～60分前に服用