

【非小細胞肺癌】

レジメン名称: ライブリバント+ラズクルーズ(80kg未満)【2コース目以降】 インターバル日数: 14 日 基準日: day 1  
 催吐性リスク: 軽度

使用する抗癌剤:

| Rp | 手技   | 薬剤名称        | 標準値         | 上限値 | 投与   | ルート     | 組織侵襲性 |
|----|------|-------------|-------------|-----|------|---------|-------|
| 4  | 点滴静注 | ライブリバント点滴静注 | 1050mg/body |     | day1 | フィルター付き | 非炎症性  |

| Rp | 手技   | 薬剤名称                                                                                          | 用量/単位                 | day1 |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 1  | 点滴静注 | 生理食塩液 100ml<br>ルートキープ用<br>点滴静注:<br>* 点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン                                 | 100ml                 | 投与順1 |
| 2  | 点滴静注 | デキサート注射液1.65mg/0.5ml<br>ボララミン注5mg/1ml<br>生理食塩液 100ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管 | 4A<br>1A<br>100ml     | 投与順2 |
| 3  | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間5分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                            | 50ml                  | 投与順3 |
| 4  | 点滴静注 | ライブリバント点滴静注<br>生理食塩液 250ml<br>点滴静注:<br>* 125ml/hrで投与<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                       | 1050mg/body<br>計250ml | 投与順4 |
| 5  | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間5分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                            | 50ml                  | 投与順5 |

| Rp | 手技 | 薬剤名称            | 用量/単位  | day1     |
|----|----|-----------------|--------|----------|
| 1  | 内服 | アセトアミノフェン錠500mg | 1000mg | 1000mg   |
| 2  | 内服 | ラズクルーズ錠         | 240mg  | 1日1回連日投与 |

★治療開始後4か月間、アピキサバン1回2.5mg1日2回経口投与  
 ★アセトアミノフェンはライブリバントの投与30～60分前に服用