

【乳癌】

レジメン名称:TC(乳癌)

インターバル日数:21日間 基準日:day1

催吐性リスク:中等度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	ドセタキセル点滴静注液	75mg/m ²	—	day1	—	壊死性
4	点滴静注	注射用エンドキサン	600mg/m ²	—	day1	—	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml グラニセترون点滴静注 3mg/100ml * 点滴時間 30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 100ml	投与順2
3	点滴静注	ドセタキセル点滴静注液 大塚糖液 5% 250ml * 点滴時間 1時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	75mg/m ² 250ml	投与順3
4	点滴静注	注射用エンドキサン 生理食塩液 250ml * 点滴時間 30分 投与経路:末梢ルートメイ側管	600mg/m ² 250ml	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間 5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順5

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	内服	デカドロン	8mg	—	8mg	8mg	8mg