

【乳がん】

レジメン名称:アブラキサン+テセントリク
催吐性リスク:軽度

インターバル日数:28日間 基準日:day1

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	中心静脈注射	テセントリク点滴静注	1680mg/body	—	day1	フィルター付き	非炎症性
5	中心静脈注射	アブラキサン注	100mg/m ²	—	day1、8、15	フィルター禁止	壊死性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	中心静脈注射	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: 投与経路:CVルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	中心静脈注射	テセントリク点滴静注 生理食塩液 250ml 点滴静注: * 点滴時間 初回60分、2回目以降30分 投与経路:CVルートメイン	1680mg/body 250ml	投与順2	—	
3	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間 5分 投与経路:CVルートメイン	50ml	投与順3	—	
4	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間 5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順4	投与順2	投与順2
5	中心静脈注射	アブラキサン点滴静注用 生理食塩液 50ml 1Vあたり生食20mlで溶解 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン側管	100mg/m ² 必要量	投与順5	投与順3	投与順3
6	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順6	投与順4	投与順4