

## 【尿路上皮癌】

レジメン名称: GC+オブジーボ

催吐性リスク: 高度

インターバル日数: 21 日 基準日: day 1

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	オブジーボ点滴静注	360mg/body	-	day1	フィルター付き	非炎症性
9	点滴静注	ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m <sup>2</sup>	-	day1、8	-	炎症性
12	点滴静注	シスプラチニ点滴静注	70mg/m <sup>2</sup>	-	day1	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day8
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1				投与順1
2	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順2				
3	点滴静注	オブジーボ点滴静注 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	360mg/body 100ml	投与順3				
4	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順4				
5	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml バロノセロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 1V 6A 100ml	投与順5				
6	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	4A 100ml		投与順1 メイン	投与順1 メイン	投与順1 メイン	投与順2
7	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順6				投与順4
8	点滴静注	アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 硫酸Mg補正液1mEq/ml20ml 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1A 0.4A 500ml	投与順7				
9	点滴静注	ゲムシタビン点滴静注用 生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1000mg/m <sup>2</sup> 100ml	投与順8				投与順3
10	点滴静注	生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml	投与順9				
11	点滴静注	20%マンニトール 300ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	200ml	投与順10				
12	点滴静注	シスプラチニ点滴静注 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間120分 投与経路:末梢ルートメイン側管	70mg/m <sup>2</sup> 計500ml	投与順11				
13	点滴静注	生理食塩液 500ml アスパラギン酸カリウム注10mEq/10ml 点滴静注: * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml 1A	投与順12				
14	点滴静注	生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴速度60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml	投与順13				
15	点滴静注	ソルアセトF 500ml 点滴静注: * 点滴速度60分 投与経路:末梢ルートメイン	500ml		投与順2	投与順2		
16	点滴静注	ソルアセトF 500ml 点滴静注: * 点滴速度60分 投与経路:末梢ルートメイン	500ml		投与順3	投与順3		