

【乳癌】

レジメン名称: エンハーツ(乳癌)

催吐性リスク: 中等度

インターバル日数: 21日間 基準日: day1

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	中心静脈注射	エンハーツ点滴静注用	5.4mg/kg	—	day1	フィルター付き	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	中心静脈注射	生理食塩液 100ml ルートキープ用 投与経路: CVルートメイン	100ml	投与順1
2	中心静脈注射	アロカリス点滴静注235mg/10ml パロノセトロン静注0.75mg/5ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路: CVルートメイン側管	1V 1V 6A 100ml	投与順2
3	中心静脈注射	5%糖液 100ml * 点滴時間5分 投与経路: CVルートメイン側管	50ml	投与順3
4	中心静脈注射	エンハーツ点滴静注用 注射用水20ml 5%糖液 100ml 遮光 100mgを5mlの注射用水で溶解(20mg/ml) * 点滴時間初回90分、2回目以降30分 投与経路: CVルートメイン側管	5.4mg/kg 必要量 100ml	投与順4
5	中心静脈注射	5%糖液 100ml * 点滴時間5分 投与経路: CVルートメイン側管	50ml	投与順5