

【大腸癌】

レジメン名称: FOLFIRI+アービタックス1週間毎【2回目以降インターバル日数: 14日 基準日: day1

催吐性リスク: 中等度

使用する抗がん剤:

| Rp | 手技     | 薬剤名称         | 標準値                   | 上限値 | 投与     | ルート | 組織侵襲性 |
|----|--------|--------------|-----------------------|-----|--------|-----|-------|
| 5  | 中心静脈注射 | アービタックス注射用   | 250mg/m <sup>2</sup>  | -   | day1、8 | -   | 非炎症性  |
| 8  | 中心静脈注射 | イリノテカン点滴静注   | 150mg/m <sup>2</sup>  | -   | day1   | -   | 炎症性   |
| 7  | 中心静脈注射 | レボホリナート点滴静注用 | 200mg/m <sup>2</sup>  | -   | day1   | -   | -     |
| 9  | 中心静脈注射 | 5-FU注        | 400mg/m <sup>2</sup>  | -   | day1   | -   | 炎症性   |
| 10 | 中心静脈注射 | 5-FU注        | 2400mg/m <sup>2</sup> | -   | day1   | -   | 炎症性   |

| Rp | 手技     | 薬剤名称   | 用量/単位                         | day1 | day8       |
|----|--------|--|-------------------------------|------|------------|
| 1  | 中心静脈注射 | 生理食塩液 100ml<br>ルートキープ用<br>中心静脈注射:<br>投与経路:CVルートメイン   | 100ml                         | 投与順1 | 投与順1       |
| 2  | 中心静脈注射 | デキサート注射液1.65mg/0.5ml<br>ポラミン注5mg<br>アロカリス点滴静注235mg/10ml<br>グラニセトロン点滴静注3mg/100ml<br>中心静脈注射:<br>* 点滴時間30分<br>投与経路:CVルートメイン | 4A<br>1A<br>1V<br>1P          | 投与順2 |            |
| 3  | 中心静脈注射 | デキサート注射液1.65mg/0.5ml<br>ポラミン注5mg<br>生理食塩液 100ml<br>中心静脈注射:<br>* 点滴時間30分<br>投与経路:CVルートメイン                                 | 4A<br>1A<br>100ml             |      | 投与順2<br>側管 |
| 4  | 中心静脈注射 | 生理食塩液 50ml<br>中心静脈注射:<br>* 点滴時間5分<br>投与経路:CVルートメイン   | 50ml                          | 投与順3 |            |
| 5  | 中心静脈注射 | アービタックス注射用<br>生理食塩液 250ml<br>中心静脈注射:<br>* 点滴時間 1時間<br>投与経路:CVルートメイン  | 250mg/m <sup>2</sup><br>250ml | 投与順4 | 投与順3<br>側管 |
| 6  | 中心静脈注射 | 生理食塩液 100ml<br>中心静脈注射:<br>* 点滴時間 1時間<br>投与経路:CVルートメイン  | 100ml                         | 投与順5 | 投与順4<br>側管 |
| 7  | 中心静脈注射 | レボホリナート点滴静注用<br>大塚糖液 5% 250ml<br>中心静脈注射:<br>* 点滴時間2時間<br>イリノテカンと同時に<br>投与経路:CVルートメイン側管                                   | 200mg/m <sup>2</sup><br>250ml | 投与順6 |            |
| 8  | 中心静脈注射 | イリノテカン点滴静注<br>大塚糖液 5% 250ml<br>中心静脈注射:<br>* 点滴時間2時間<br>レボホリナートと同時に<br>投与経路:CVルートメイン                                      | 150mg/m <sup>2</sup><br>250ml | 投与順7 |            |
| 9  | 中心静脈注射 | 5-FU注<br>生理食塩液 50ml<br>中心静脈注射:<br>* 点滴時間5分<br>投与経路:CVルートメイン  | 400mg/m <sup>2</sup><br>50ml  | 投与順8 |            |
| 10 | 中心静脈注射 | 5-FU注<br>生理食塩液<br>中心静脈注射:<br>* 点滴時間46時間<br>投与経路:CVルートメイン   | 2400mg/m <sup>2</sup><br>適宜   | 投与順9 |            |

| Rp | 手技 | 薬剤名称  | 用量/単位 | day1 | day2 | day3 | day4 |
|----|----|-------|-------|------|------|------|------|
| 1  | 内服 | デカドロン | 4mg   |      | 4mg  | 4mg  | 4mg  |