

【大腸癌】

レジメン名称: イリノテカン+ベクテビックス

インターバル日数: 14日

基準日: day1

催吐性リスク: 中等度

使用する抗がん剤:

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 投与 | ルート | 組織侵襲性 |
|----|--------|-------------|----------------------|-----|------|---------|-------|
| 4 | 中心静脈注射 | ベクテビックス点滴静注 | 6mg/kg | - | day1 | フィルター付き | 非炎症性 |
| 6 | 中心静脈注射 | イリノテカン点滴静注 | 150mg/m ² | - | day1 | | 炎症性 |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 |
|----|--------|--|-------------------------------|------|
| 1 | 中心静脈注射 | 生理食塩液 100ml ルートキープ用 中心静脈注射: 投与経路:CVルートメイン | 100ml | 投与順1 |
| 2 | 中心静脈注射 | デキサート注射液1.65mg/0.5ml アロカリス点滴静注235mg/10ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml 中心静脈注射: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン側管 | 4A 1V 1P | 投与順2 |
| 3 | 中心静脈注射 | 生理食塩液 50ml 中心静脈注射: * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管 | 50ml | 投与順3 |
| 4 | 中心静脈注射 | ベクテビックス点滴静注 生理食塩液 100ml 中心静脈注射: * 点滴時間60分 投与経路:CVルートメイン側管 | 6mg/kg 100ml | 投与順4 |
| 5 | 中心静脈注射 | 生理食塩液 50ml 中心静脈注射: * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管 | 50ml | 投与順5 |
| 6 | 中心静脈注射 | イリノテカン点滴静注 大塚糖液 5% 250ml 中心静脈注射: * 点滴時間90分 投与経路:CVルートメイン側管 | 150mg/m ² 250ml | 投与順6 |
| 7 | 中心静脈注射 | 生理食塩液 50ml 中心静脈注射: * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管 | 50ml | 投与順7 |

| Rp | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | day1 | day2 | day3 | day4 |
|----|----|-------|-------|------|------|------|------|
| 1 | 内服 | デカドロン | 4mg | | 4mg | 4mg | 4mg |