

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : GB (1コース目)  
 催吐性リスク : 中等度

インターバル日数 : 28日  
 基準日 : day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
7	点滴静注	ガザイバ点滴静注	1000mg/body	-	day1、8、15	フィルター付き	非壊死性	-
4	点滴静注	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液	90mg/m <sup>2</sup>	-	day1、2	-	炎症性	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day8	day15
1	点滴静注	生理食塩液100ml ルートキープ用 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	パロノセトロン静注0.75mg デキササート注射液1.65mg 生理食塩液 100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 10A 100ml	投与順2			
3	点滴静注	生理食塩液 100ml デキササート注射液1.65mg 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml 3A		投与順2		
4	点滴静注	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間10分 投与経路:末梢ルートメイン側管	90mg/m <sup>2</sup> 50ml	投与順3	投与順3		
5	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml	投与順4			
6	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml			投与順2	投与順2
7	点滴静注	ガザイバ点滴静注 生理食塩液 250ml 点滴静注 ※点滴時間は主治医入力 投与経路:末梢ルートメイン側管	1000mg/body 計250ml	投与順5		投与順3	投与順3
8	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml	投与順6			
9	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml		投与順4	投与順4	投与順4

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2、3	day8	day15
1	内服	アプレピタントカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg		
2	内服	アセトアミノフェン錠	1000mg	1000mg		1000mg	1000mg
3	内服	ポララミン錠	2mg	2mg		2mg	2mg
4	内服	デカドロン錠	20mg			20mg	20mg

★ アセトアミノフェン、ポララミン、デカドロンはガザイバ投与開始の60分前に服用