

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : GB (2~6コース目)
 催吐性リスク : 中等度

インターバル日数 : 28日
 基準日 : day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
3	点滴静注	ガザイバ点滴静注	1000mg/body	-	day1	フィルター付き	非壊死性	-
8	点滴静注	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液	90mg/m ²	-	day1、2	-	炎症性	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキーブ用 点滴静注 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	
2	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml	投与順2	
3	点滴静注	ガザイバ点滴静注 生理食塩液 250ml 点滴静注 ※点滴時間は主治医入力 投与経路:末梢ルートメイン側管	1000mg/body 計250ml	投与順3	
4	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順4	
5	点滴静注	パロノセトロン静注0.75mg 生理食塩液 100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 100ml	投与順5	
6	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキーブ用 点滴静注 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml		投与順1
7	点滴静注	デキサート注射液1.65mg 生理食塩液 100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	3A 100ml		投与順2
8	点滴静注	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間10分 投与経路:末梢ルートメイン側管	90mg/m ² 50ml	投与順6	投与順3
9	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順7	投与順4

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	アプレピタントカプセル	125mg、80mg	125mg	80mg	80mg
2	内服	アセトアミノフェン錠	1000mg	1000mg		
3	内服	ポララミン錠	2mg	2mg		
4	内服	デカドロン錠	20mg	20mg		

★ アセトアミノフェン、ポララミン、デカドロンはガザイバ投与開始の60分前に服用