

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : Pola+BR(1コース目)
 催吐性リスク : 中等度

インターバル日数 : 21 日
 基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
4	点滴静注	リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²	-	day1		非炎症性	-
8	点滴静注	ポライビー点滴静注用	1.8mg/kg	-	day2	フィルター付	非炎症性	-
11	点滴静注	ペンダムスチン塩酸塩点滴静注液	90mg/m ²	-	day2、3		炎症性	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	点滴静注	生理食塩液100ml ルートキープ用 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路: 末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	静注	ポラミン注5mg/1ml 生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間5分 投与経路: 末梢ルートメイン側管	1A 50ml	投与順2		
3	点滴静注	ソルメドロール静注125mg 生理食塩液 100ml 点滴静注 ※点滴時間30分 投与経路: 末梢ルートメイン側管	125mg 100ml	投与順3		
4	点滴静注	リツキシマブBS点滴静注 生理食塩液 1000ml 10倍希釈になるように調製 点滴静注 ※点滴時間は主治医入力 投与経路: 末梢ルートメイン側管	375mg/m ² 10倍希釈になる量 (主治医入力)	投与順4		
5	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 点滴時間5分 投与経路: 末梢ルートメイン側管	50ml	投与順5		
6	点滴静注	パロノセトロン静注0.75mg デキサート注射液1.65mg ポラミン注5mg/1ml 生理食塩液100ml 点滴静注 * 点滴時間30分 投与経路: 末梢ルートメイン側管	1V 3A 1A 100ml		投与順2	
7	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注 点滴時間30分 投与経路: 末梢ルートメイン側管			投与順3	
8	点滴静注	ポライビー点滴静注用 30mg/Vは1.8ml、140mg/Vは7.2mlで溶解⇒20mg/mlとなる 注射用水20ml 生理食塩液 100ml 0.72mg/ml～2.7mg/ml 72mg未満は生食50mlに変更 点滴静注 * 点滴時間90分 投与経路: 末梢ルートメイン側管	1.8mg/kg 30mg/Vは1.8ml、140mg/Vは7.2ml 100ml		投与順4	
9	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注 点滴時間30分 投与経路: 末梢ルートメイン側管	100ml		投与順5	
10	点滴静注	デキサート注射液1.65mg 生理食塩液 100ml 点滴静注 点滴時間30分 投与経路: 末梢ルートメイン側管	3A 100ml			投与順2
11	点滴静注	ペンダムスチン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液 50ml 点滴静注 * 点滴時間10分 投与経路: 末梢ルートメイン側管	90mg/m ² 50ml		投与順6	投与順3
12	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 点滴時間5分 投与経路: 末梢ルートメイン側管	50ml		投与順7	投与順4

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	内服	アプレピタントカプセル	125mg、80mg		125mg	80mg	80mg