

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : エプキンリ(LBCL)【1サイクル】

催吐性リスク : 最小度

インターバル日数 : 28 日

基準日 : day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
7 8 9	皮下注	エプキンリ皮下注	0.16mg/body 0.8mg/body 48mg/body	-	day1 day8 day15、22	-	該当なし

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15	day22
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	生理食塩液 500ml 点滴静注 ※点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	アセリオ静注液 1000mgバッグ 点滴静注 ※点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1P	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	ボラミン注5mg/1ml 生理食塩液 50ml ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1A 50ml	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4
5	点滴静注	デキサート注射液1.65mg 生理食塩液 50ml ※点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン側管	8A 50ml	投与順5	投与順5	投与順5	投与順5
6	点滴静注	生理食塩液 100ml ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml	投与順6	投与順6	投与順6	投与順6
7	皮下注	エプキンリ皮下注 皮下投与	0.16mg/body	投与順7			
8	皮下注	エプキンリ皮下注 皮下投与	0.8mg/body		投与順7		
9	皮下注	エプキンリ皮下注 皮下投与	48mg/body			投与順7	投与順7

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day2~4	day9~11	day16~18	day23~25
1	内服	デカドロン錠	16mg	16mg	16mg	16mg	16mg