

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : ロイスタチン

インターバル日数 : 28日

基準日 : day1

催吐性リスク : 最小度

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性	総投与量
4	点滴静注	ロイスタチン注	0.12mg/kg	-	day1～5	-	非炎症性	-

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1P	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	ロイスタチン注 生理食塩液 500ml 点滴静注: * 点滴時間2時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	0.12mg/kg 500ml	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順5	投与順5	投与順5	投与順5	投与順5