

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : ロイスタチン+リツキシマブ  
 催吐性リスク : 最小度

インターバル日数 : 28日

基準日 : day1

★登録はインターバル7日

★day8からのリツキシマブはリツキシマブ単独レジメンを使用

使用する抗がん剤:

| Rp | 手技   | 薬剤名称         | 標準値                  | 上限値 | 投与                       | ルート | 組織侵襲性 | 総投与量 |
|----|------|--------------|----------------------|-----|--------------------------|-----|-------|------|
| 4  | 点滴静注 | ロイスタチン注      | 0.12mg/kg            | -   | day1~5                   | -   | 非炎症性  | -    |
| 8  | 点滴静注 | リツキシマブBS点滴静注 | 375mg/m <sup>2</sup> | -   | day1,8,15,22,29,36,43,50 | -   | 非炎症性  | -    |

| Rp | 手技   | 薬剤名称                                                                                    | 用量/単位                                            | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | 点滴静注 | 生理食塩液 100ml<br>ルートキープ用<br>点滴静注:<br>投与経路:末梢ルートメイン                                        | 100ml                                            | 投与順1 | 投与順1 | 投与順1 | 投与順1 | 投与順1 |
| 2  | 点滴静注 | グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                         | 1P                                               | 投与順2 | 投与順2 | 投与順2 | 投与順2 | 投与順2 |
| 3  | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間5分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                      | 50ml                                             | 投与順3 | 投与順3 | 投与順3 | 投与順3 | 投与順3 |
| 4  | 点滴静注 | ロイスタチン注<br>生理食塩液 500ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間2時間<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                         | 0.12mg/kg<br>500ml                               | 投与順4 | 投与順4 | 投与順4 | 投与順4 | 投与順4 |
| 5  | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間5分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                      | 50ml                                             | 投与順5 | 投与順5 | 投与順5 | 投与順5 | 投与順5 |
| 6  | 点滴静注 | ボラミン注5mg/1ml<br>生理食塩液 50ml<br>点滴静注:<br>* 点滴時間5分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                      | 1A<br>50ml                                       | 投与順6 |      |      |      |      |
| 7  | 点滴静注 | ソルメドロール静注125mg<br>生理食塩液 100ml<br>点滴静注<br>※点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                    | 125mg<br>100ml                                   | 投与順7 |      |      |      |      |
| 8  | 点滴静注 | リツキシマブBS点滴静注<br>生理食塩液 1000ml<br>10倍希釈になるように調製<br>点滴静注<br>※点滴時間は主治医入力<br>投与経路:末梢ルートメイン側管 | 375mg/m <sup>2</sup><br>10倍希釈になる量<br><br>(主治医入力) | 投与順8 |      |      |      |      |
| 9  | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml<br>点滴静注<br>※点滴時間5分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                        | 50ml                                             | 投与順9 |      |      |      |      |