

【子宮体癌】

レジメン名称: TC+イミフィンジ

催吐性リスク: 中等度

インターバル日数: 21日

基準日: day 1

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	イミフィンジ点滴静注	1120mg/body	—	day1	フィルター付	非炎症性
7	点滴静注	パクリタキセル注射用	175mg/m ²	—	day1	PVCフリー/フィルター付き	壊死性
8	点滴静注	カルボプラチン点滴静注	AUC5~6	900mg	day1		炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順2
3	点滴静注	イミフィンジ点滴静注 生理食塩液 100ml * 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1120mg/body 100ml	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順4
5	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/100ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml ファモチジン静注20mg/20ml ポララミン注5mg/1ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1V 1P 12A 1A 1A	投与順5
6	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml	投与順6
7	点滴静注	パクリタキセル注射用 大塚糖液5% 500ml 点滴静注: * 点滴時間3時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	175mg/m ² 500ml	投与順7
8	点滴静注	カルボプラチン点滴静注 大塚糖液5% 250ml AUCは5~6 登録はAUC5 必要時変更してください 点滴静注: * 点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	AUC5 250ml	投与順8
9	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順9

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	デカドロン錠	4mg		4mg	4mg