

【多発性骨髄腫】

レジメン名称 : DARA単剤(1～2サイクル)

インターバル日数 : 28日

催吐性リスク : 最小度

基準日: day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
1	皮下注	ダラキューロ配合皮下注	1800mg/body	－	day1、8、15、22	－	非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15	day22
1	皮下注	ダラキューロ配合皮下注 翼状針使用のため15.5mlで調製 皮下投与	1800mg/body	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15	day22
1	内服	アセトアミノフェン錠500mg	1000mg	1000mg	1000mg	1000mg	1000mg
2	内服	ポララミン錠2mg	2mg	2mg	2mg	2mg	2mg
3	内服 1サイクル	デカドロン錠4mg	12mg/8mg	12mg	12mg	8mg	8mg
3	内服 2サイクル	デカドロン錠4mg	8mg	8mg	8mg	8mg	8mg

★ 1サイクルのday1のみモンテルカスト錠(10mg)1錠の内服も推奨

★ アセトアミノフェン、ポララミン、デカドロン、モンテルカスト(1サイクルday1のみ)はダラキューロの投与1時間以上前に投与終了

★ 輸血時の間接クームス試験に影響あり