

【大腸癌】

レジメン名称: イリノテカン+アービタックス

インターバル日数: 14日

基準日: day1

催吐性リスク: 中等度

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	中心静脈注射	アービタックス注射用	500mg/m ²	-	day1		非炎症性
6	中心静脈注射	イリノテカン点滴静注	150mg/m ²	-	day1		炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	中心静脈注射	生理食塩液 100ml ルートキープ用 中心静脈注射: 投与経路:CVルートメイン	100ml	投与順1
2	中心静脈注射	デキサート注射液1.65mg/0.5ml ポララミン注5mg アロカリス点滴静注235mg/10ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml 中心静脈注射: * 点滴時間30分 投与経路:CVルートメイン側管	4A 1A 1V 1P	投与順2
3	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 中心静脈注射: * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順3
4	中心静脈注射	アービタックス注射用 生理食塩液 500ml 中心静脈注射: * 点滴時間2時間 投与経路:CVルートメイン側管	500mg/m ² 計500ml	投与順4
5	中心静脈注射	生理食塩液 100ml 中心静脈注射: * 点滴時間1時間 投与経路:CVルートメイン側管	100ml	投与順5
6	中心静脈注射	イリノテカン点滴静注 大塚糖液 5% 250ml 中心静脈注射: * 点滴時間1.5時間 投与経路:CVルートメイン側管	150mg/m ² 250ml	投与順6
7	中心静脈注射	生理食塩液 50ml 中心静脈注射: * 点滴時間5分 投与経路:CVルートメイン側管	50ml	投与順7

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4
1	内服	デカドロン錠	4mg		4mg	4mg	4mg