

【乳癌】

レジメン名称:ツカイザ+ゼローダ+トラスツズマブ(初回)

インターバル日数:21日間 基準日:day1

催吐性リスク:軽度

使用する抗癌剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
2	点滴静注	トラスツズマブBS点滴静注用	8mg/kg	—	day1	—	非炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	トラスツズマブBS点滴静注用 注射用水 20ml 生理食塩液 250ml 150mg/Vは注射用水7.2ml、 60mg/Vは注射用水3mlで溶解(21mg/ml) * 点滴時間90分 投与経路:末梢ルートメイン	8mg/kg 必要量 250ml	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 50ml * 点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順3

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	
1	内服	ツカイザ	1回 300mg 1日2回	連日
2	内服	ゼローダ	1回1000mg/m ² 1日2回	day1～day14