

【卵巣癌】

レジメン名称 : DC

インターバル日数 : 21 日

催吐性リスク : 中等度

基準日 : day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	点滴静注	ドセタキセル注	75mg/m ²		day1	-	壊死性
5	点滴静注	カルボプラチン注	AUC5	750mg	day1	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml 1V グラニセトロン点滴静注3mg/100 1P デキサート注射液1.65mg/0.5ml 3A 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管		投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順3
4	点滴静注	ドセタキセル注 5%大塚糖液 250ml 点滴静注 ※点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	75mg/m ² 250ml	投与順4
5	点滴静注	カルボプラチン注 5%大塚糖液 250ml 点滴静注 ※点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	AUC5 250ml	投与順5
6	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン	50ml	投与順6

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	デカドロン錠	4mg		4mg	4mg