

【卵巣癌】

レジメン名称 TC(卵巣癌)

催吐性リスク 中等度

インターバル日数 : 21 日

基準日: day 1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
4	点滴静注	パクリタキセル注	175mg/m ²		day1	PVCフリー/フィルター付き	壊死性
5	点滴静注	カルボプラチン注	AUC6	900mg	day1	-	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1
2	点滴静注	アロカリス点滴静注235mg/10ml グラニセトロン点滴静注3mg/100ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml ファモチジン静注20mg/20ml ポララミン注5mg 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路末梢ルートメイン側管	1V 1P 12A 1A 1A	投与順2
3	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注: * 点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml	投与順3
4	点滴静注	パクリタキセル注 5%大塚糖液 500ml 点滴静注 ※点滴時間3時間 投与経路末梢ルートメイン側管	175mg/m ² 500ml	投与順4
5	点滴静注	カルボプラチン注 5%大塚糖液 250ml 点滴静注 ※点滴時間1時間 投与経路末梢ルートメイン側管	AUC6 250ml	投与順5
6	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注 ※点滴時間5分 投与経路末梢ルートメイン側管	50ml	投与順6

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3
1	内服	デカドロン錠	4mg		4mg	4mg