

【小細胞肺癌】

レジメン名称: ハイカムチン(肺癌) 催吐性リスク: 軽度

インターバル日数: 21日 基準日: day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	ハイカムチン点滴静注液	1mg/m ²		day1.2.3.4.5	ー	炎症性

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day2	day3	day4	day5
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/.5ml 生理食塩液 100ml 点滴静注: ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン 側管	4A 100ml	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	ハイカムチン点滴静注液 生理食塩液 100ml 点滴静注: ※点滴時30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1mg/m ² 100ml	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	50ml	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4	投与順4