

**【泌尿器 腎細胞癌】**

レジメン名称: オプジーボ2週間毎(腎細胞癌)

インターバル日数: 14日間 基準日: day1

催吐性リスク: 最小度

使用する抗癌剤:

| Rp | 手技   | 薬剤名称      | 標準値        | 上限値 | 投与   | ルート     | 組織侵襲性 |
|----|------|-----------|------------|-----|------|---------|-------|
| 2  | 点滴静注 | オプジーボ点滴静注 | 240mg/body | —   | day1 | フィルター付き | 非炎症性  |

| Rp | 手技   | 薬剤名称                                                   | 用量/単位               | day1 |
|----|------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|
| 1  | 点滴静注 | 生理食塩液 100ml<br>* 点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン              | 100ml               | 投与順1 |
| 2  | 点滴静注 | オプジーボ点滴静注<br>生理食塩液 100ml<br>* 点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン | 240mg/body<br>100ml | 投与順2 |
| 3  | 点滴静注 | 生理食塩液 50ml<br>* 点滴時間5分<br>投与経路:末梢ルートメイン                | 50ml                | 投与順3 |