

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : ルンスミオ+ポライビー(1サイクル)

催吐性リスク : 最小度

インターバル日数 : 21 日

基準日: day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
8	点滴静注	ポライビー点滴静注用	1.8mg/kg	－	day1	フィルター付	非炎症性
10	皮下注	ルンスミオ皮下注	5mg/body	－	day1	－	該当なし
11			45mg/body		day8、15		

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day8	day15
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	生理食塩液 500ml 点滴静注 ※点滴時間1時間 投与経路:末梢ルートメイン側管	500ml	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	アセリオ静注液 1000mgパック 点滴静注 ※点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1P	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	ポラミン注5mg/1ml 生理食塩液 50ml ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1A 50ml	投与順4	投与順4	投与順4
5	点滴静注	デキサート注射液1.65mg 生理食塩液 50ml ※点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン側管	10A 50ml	投与順5	投与順5	投与順5
6	点滴静注	生理食塩液 100ml ※点滴時間30分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml	投与順6		
7	点滴静注	生理食塩液 100ml ※点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml		投与順6	投与順6
8	点滴静注	ポライビー点滴静注用 30mg/Vは1.8ml、140mg/Vは7.2mlで溶解(20mg/ml) 注射用水20ml 生理食塩液 100ml 0.72mg/ml～2.7mg/ml 72mg未満は生食50mlに変更 点滴静注 * 点滴時間90分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1.8mg/kg 必要量 100ml	投与順7		
9	点滴静注	生理食塩液 100ml 点滴静注 点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml	投与順8		
10	皮下注	ルンスミオ皮下注 30秒から2分かけて投与 皮下投与	5mg/body	投与順9		
11	皮下注	ルンスミオ皮下注 30秒から2分かけて投与 皮下投与	45mg/body		投与順7	投与順7