

【悪性リンパ腫】

レジメン名称 : ルンスミオ+ポライビー(2～6サイクル)  
 催吐性リスク : 最小度

インターバル日数 : 21 日  
 基準日 : day1

使用する抗がん剤:

| Rp | 手技   | 薬剤名称       | 標準値       | 上限値 | 投与   | ルート    | 組織侵襲性 |
|----|------|------------|-----------|-----|------|--------|-------|
| 7  | 点滴静注 | ポライビー点滴静注用 | 1.8mg/kg  | －   | day1 | フィルター付 | 非炎症性  |
| 9  | 皮下注  | ルンスミオ皮下注   | 45mg/body | －   | day1 | －      | 該当なし  |

| Rp | 手技   | 薬剤名称                                                                                                                                                       | 用量/単位                                 | day1 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|
| 1  | 点滴静注 | 生理食塩液 100ml<br>ルートキープ用<br>点滴静注<br>投与経路:末梢ルートメイン                                                                                                            | 100ml                                 | 投与順1 |
| 2  | 点滴静注 | 生理食塩液 500ml<br>点滴静注<br>※点滴時間1時間<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                                                                                         | 500ml                                 | 投与順2 |
| 3  | 点滴静注 | アセリオ静注液 1000mgパック<br>点滴静注<br>※点滴時間15分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                                                                                   | 1P                                    | 投与順3 |
| 4  | 点滴静注 | ポララミン注5mg/1ml<br>生理食塩液 50ml<br>※点滴時間5分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                                                                                  | 1A<br>50ml                            | 投与順4 |
| 5  | 点滴静注 | デキサート注射液1.65mg<br>生理食塩液 50ml<br>※点滴時間15分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                                                                                | 10A<br>50ml                           | 投与順5 |
| 6  | 点滴静注 | 生理食塩液 100ml<br>※点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                                                                                                 | 100ml                                 | 投与順6 |
| 7  | 点滴静注 | ポライビー点滴静注用<br>30mg/VIは1.8ml、140mg/VIは7.2mlで溶解<br>注射用水20ml<br>生理食塩液 100ml<br>0.72mg/ml～2.7mg/ml<br>72mg未満は生食50mlに変更<br>点滴静注<br>* 点滴時間30分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管 | 1.8mg/kg<br>(20mg/ml)<br>必要量<br>100ml | 投与順7 |
| 8  | 点滴静注 | 生理食塩液 100ml<br>点滴静注<br>点滴時間60分<br>投与経路:末梢ルートメイン側管                                                                                                          | 100ml                                 | 投与順8 |
| 9  | 皮下注  | ルンスミオ皮下注<br>30秒から2分かけて投与<br>皮下投与                                                                                                                           | 45mg/body                             | 投与順9 |