

【多発性骨髄腫】

レジメン名称 : エルレフィオ(1～2週目)

催吐性リスク : 最小度

インターバル日数 : 14 日

基準日: day1

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
6	皮下注	エルレフィオ皮下注	12mg/body	-	day1	-	該当なし
7			32mg/body		day4		
8			76mg/body		day8		

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	day1	day4	day8
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注 投与経路:末梢ルートメイン	100ml	投与順1	投与順1	投与順1
2	点滴静注	アセリオ静注液 1000mgパック [※] 点滴静注 ※点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1P	投与順2	投与順2	投与順2
3	点滴静注	ポララミン注5mg/1ml 生理食塩液 50ml ※点滴時間5分 投与経路:末梢ルートメイン側管	1A 50ml	投与順3	投与順3	投与順3
4	点滴静注	デキサート注射液1.65mg 生理食塩液 50ml ※点滴時間15分 投与経路:末梢ルートメイン側管	10A 50ml	投与順4	投与順4	投与順4
5	点滴静注	生理食塩液 100ml ※点滴時間60分 投与経路:末梢ルートメイン側管	100ml	投与順5	投与順5	投与順5
6	皮下注	エルレフィオ皮下注 皮下投与	12mg/body	投与順6		
7	皮下注	エルレフィオ皮下注 皮下投与	32mg/body		投与順6	
8	皮下注	エルレフィオ皮下注 皮下投与	76mg/body			投与順6