

【非小細胞肺癌】

レジメン名称: ペメトレキセド+タグリッソ維持

インターバル日数: 21日 基準日: day1

催吐性リスク: 軽度

使用する抗がん剤:

Rp	手技	薬剤名称	標準値	上限値	投与	ルート	組織侵襲性
3	点滴静注	ペメトレキセド点滴静注液	500mg/m ²		day1	—	非炎症性
3	内服	タグリッソ錠	80mg		連日	—	—

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1
1	点滴静注	生理食塩液 100ml ルートキープ用 点滴静注: 投与経路:末梢メインルート	100ml	投与順1
2	点滴静注	生理食塩液 100ml デキサート注射液1.65mg/0.5ml 点滴静注: ※点滴時間30分 投与経路:末梢メインルート 側管	100ml 4A	投与順2
3	点滴静注	ペメトレキセド点滴静注液 生理食塩液 100ml 点滴静注: ※点滴時間10分 投与経路:末梢メインルート 側管	500mg/m ² 計100ml	投与順3
4	点滴静注	生理食塩液 50ml 点滴静注: ※点滴時間5分 投与経路:末梢メインルート側管	50ml	投与順4

Rp	手技	薬剤名称	用量/単位	
1	内服	パンビタン末	1g(葉酸0.5mg)	初回投与の7日前から連日投与
2	筋肉注射	メチコパール注射液500μg	1000μg(2A)	初回投与の7日前に投与、その後9週ごと(3コースごと)に1回投与
3	内服	タグリッソ錠	80mg	1日1回 1回80mg 連日